

早期中干しで「穂肥」を 散布できる稲姿にしよう

適期中干しによって窒素吸収量を抑えることは、適正生育量の確保につながります。過剰生育では穂肥や水管理が十分にできなくなる恐れがありますので、「少し早いかな…」くらいで、始めてみませんか！



中干し開始時の稲姿
茎数15本程度

中干し開始時期の見極め方

○中干しの開始時期は圃場によって異なります。実際に圃場に入って生育具合を確かめてから、下記の表を参考に、開始時期を決定してください。

○植え付け株数の違いによる中干し開始時期の目安

植え付け株数 (田植え機のセット)	中干し開始時期(必要な茎数)	
	目標穂数360本/m ² の8割を確保した時	
50株/坪	1株あたり 18本	m ² あたり 288本
60株/坪	1株あたり 15本	
70株/坪	1株あたり 13本	



概ね田植え後 **25~30日** が中干し開始の目安ですが、天候、気温の推移によっては1カ月を待たずに茎数が確保できる場合もありますので、自分の圃場の状態を確認することが、**重要** です！

！ 適期に確実な中干し、溝切りを行う事が、秋の収穫にとっても重要です！

新潟地方気象台の3か月予報によると…

6月

- ・期間前半の天気は、数日の周期で変わるでしょう。
- ・期間後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
- ・気温は、平年並または高い見込みです。

7月

- ・平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。
- ・降水量は、平年並または多い見込みです。



資材情報

中干し後、クサネム、イボクサでお困りの方、
新商品ワイドショット1キロ粒剤を使ってみませんか。

詳しくは、お近くの営農センターへ

